

Borttagning av penila papler

Penila papler (eng: pearly penile papules, PPP) sitter vanligen utmed ollonkanten på penis, och i fåran strax ovanför (se bild). De är små kärldmissbildningar ("angiofibrom"), och har inget som helst samband med kondylom. För den ovane kan de dock ibland misstolkas som kondylom. De är förvånansvärt vanliga, och lär förekomma i upp till 30% hos yngre män.



Behandling

Koagulering/förångning med koldioxidlaser är den överlägset bästa behandlingsmetoden.

Förberedelser

Anbringa gärna lite mer EMLA-kräm vid behov. EMLA-kräm (receptfritt på apotek) anbringas på penis vid ollonkanten cirka 20 minuter i förväg. Dra förhuden över.

Eftervård

Håll rent och tvätta vid behov med mild tvål och vatten.

Komplikationer

Hittills har under 6 år inga komplikationer uppstått och läkningen sker snabbt – inom 3-5 dygn.

Resultat

Resultatet blir fullgott redan efter 1:a behandlingen i mer än hälften (55 %) av de 108 fall vi hittills följt upp. Endast 1/3 (33 %) av patienterna har återkommit inom kort för en kompletterande behandling av oftast minimala smårester. Bara 13 % har återkommit ytterligare en eller två gånger. Det tycks också som om resultatet blir bestående och att paplerna inte återkommer, utan att alla har bildats redan i yngre tonåren.